

ALERGOCORT

Dexametasona 0,5mg

Anti-inflamatório esteroidal

Pode se usado por cães e gatos

Maior ação antiinflamatória com menor dose terapeutica

Melhor equilíbrio eletrolítico sem retenção de sódio.

Posologia: 1 comprimido ao dia para cada 5kg, podendo ser dividida a cada 12 horas.

Blister 10 comprimidos



ALERGOCORT SHAMPOO

Utilizado na pele e pelagem no alívio de coceiras, irritações e inflamações (hidrocortisona). É antialérgico, antipruriginoso e cicatrizante (Aloe Vera). Recupera o crescimento dos pelos. Indicado para cães e gatos.

Embalagem 250ml



ALERGOVET C

Único medicamento veterinário à base de clemastina para cães e gatos. Anti-histamínico totalmente seguro em uso prolongado. Permite associações com outras drogas medicamentosas e ácidos graxos essenciais. Indicado para alergias, prurido (coceira), urticária, dermatite alérgica e picadas de inseto.

Modo de Usar:

Alergovet 0,7 mg:

Cães e gatos até 2 kg – ¼ comprimido; De 2,1 a 5 kg – ½ comprimido; De 5,1 a 10 kg – 1 comprimido; De 10,1 a 15 kg – 1 ½ comprimido. Alergovet 1,4 mg:

Cães de 15,1 a 20kg – 1 comprimido; De 20,1 a 30 kg – 1 ½ comprimido; De 30,1 a 40 kg – 2 comprimidos; De 40,1 a 50 kg – 2 ½ comprimido; De 50,1 a 60 kg – 3 comprimidos.

Caixas com 10 Comprimidos



COLEIRA VAPONEX

A mais vendida do mercado;
Fácil colocação;
Efeito imediato, eficaz e duradouro por até 60 dias;
Repele pulgas e carrapatos que quando sobem no animal, não picam;
Quase imperceptível quando colocada no cachorro por ser transparente.
A base de Diclorvós

Coleira de 64cm, sobra deve ser descartada



COPROVET

Anticoprofágico para cães e gatos. Coprovet deixa as fezes não palatáveis, por isso é necessário não removê-las imediatamente, para que o cão ou gato tente novamente ingeri-las e neste caso seja desagradável para ele, facilitando a reeducação. Importante: não administrar em filhotes com menos de oito semanas. Não administrar durante a gestação e lactação.

Posologia: 1 comprimido para cada 5kg de peso, antes das refeições por 2 semanas, em caso de persistência no ato da coprofagia, continuar o tratamento por mais 2 semanas administrando 2 comprimidos para cada 5kg.

Blister 20 comprimidos



NEODEXA CREME

Creme dermatológico 6 em 1: antibiótico, antifúngico, antiinflamatório, antialérgico, anestésico e antipruriginoso. Indicado para cães, gatos e equinos no tratamento de afecções dermatológicas. Maior eficácia antifúngica (nistatina), bom para tratamento de Malassezia sp. Maior absorção (creme), não mancha o pêlo.

Aplicar na área afetada de 2 a 4 vezes ao dia, e por 48 horas após o desaparecimento dos sintomas.

Bisnaga de 15g



NEODEXA SPRAY

Indicado para cães e gatos, no tratamento de otite externa, afecções da córnea, furunculoses, dermatoses e eczemas, causados por microorganismos sensíveis aos princípios ativos da formulação. Ideal para suturas, cortes, ferimentos, queimaduras e pós-operatórios.

Posologia: 1 jato para cada 6,5 cm² de área a ser tratada, 2 vezes ao dia por um período máximo de 7 dias.

Spray de 74gr



PIPI DOG

O primeiro e mais eficaz adestrador sanitário para cães.

O mais reconhecido pelo mercado.

Indicado para cães como auxiliar no adestramento sanitário.

Modo de usar: Pingar 5 gotas em uma folha de jornal ou tapete higiênico.

Apresentação: Frasco conta-gotas 20ml



RANIVET

Indicada para cães no tratamento de distúrbios gastroentéricos como: refluxo gastresofágico, esofagite e refluxo gastroduodenal. A Ranitidina é amplamente utilizada na clínica de pequenos animais. É o mais eficiente dos antagonistas H₂, promovendo a redução da secreção gástrica.

Posologia: Cães até 10kg – 1/4 de comprimido; Cães de 10kg a 20 kg – 1/2 comprimido; Cães de 20kg a 30kg – 3/4 comprimido; Cães de 30kg a 40kg – 1 comprimido.

Apresentação: Caixa com 12 comprimidos



TETISARNOL SPRAY

Indicado para cães e gatos no tratamento de sarnas e infecções secundárias da sarna, micoses, alergias de pele, eczemas, pruridos e picadas de insetos.

Ação Completa - 5 em 1: Sarnicida, Antiinflamatório, Antimicótico (fungicida), Antialérgico e Antibiótico local.

Posologia: Aplicar um jato do produto na área afetada, a cada 12 ou 24 horas, durante 5 dias.

Apresentação: Frasco 125gr

