

ACEPROVEN GOTAS

Para uso em: Caninos e Felinos

Indicado para sedação de cães e gatos, no manejo de animais excitados e agressivos, para alguns procedimentos e tratamentos dentro da clínica, transporte em aviões ou automóvel, para cães sensíveis aos rojões. Em todas as ocasiões onde se requer a tranquilização do animal.

Dose/Via de Administração: 1 a 3 gotas/Kg administradas diretamente na boca do animal ou com um pouco de água

Venda sob prescrição do Médico Veterinário, com retenção obrigatória da notificação de receita.

Apresentação: Frasco contendo 30 mL.



KETALEX

Para uso em: Caninos, Felinos e Equinos

Indicado na medicação pré-anestésica, contenção química, indução e manutenção da anestesia geral em associação a outros fármacos como benzodiazepínicos, alfa-2 agonistas, fenotiazinas, opióides, propofol, éter, gliceril guaiacol e anestésicos inalatórios.

Venda sob prescrição do Médico Veterinário, com retenção obrigatória da notificação de receita.

Apresentação: Frasco-ampola contendo 10 e 50 mL.



SEDALEX

Para uso em Caninos e Felinos.

Indicado como analgésico, sedativo e relaxante muscular para cães e gatos.

Venda sob prescrição do Médico Veterinário, com retenção obrigatória da notificação de receita.

Apresentação: Frasco-ampola contendo 10 mL.



CARDISURE

Para uso em Cães.

Cardisure® é indicado para o tratamento dos sinais leves, moderados ou severos de insuficiência cardíaca congestiva canina (ICC) com origem em insuficiência valvar (regurgitação mitral e/ou tricúspide) ou cardiomiopatia dilatada. A base de Pimobendami.

Cardisure 1,25mg - Apresentação: Cartucho com 80 comprimidos, divididos em 8 blisters com 10 comprimidos cada. Comprimidos sulcados, sabor carne.

Cardisure 5mg - Apresentação: Cartucho com 80 comprimidos totais, divididos em 2 caixas com 8 blisters de 5 comprimidos cada (2 x 40 comprimidos). Comprimidos bissulcados, sabor carne.

Cardisure 10mg - Apresentação: Cartucho com 80 comprimidos totais, divididos em 2 caixas com 8 blisters de 5 comprimidos cada (2 x 40 comprimidos). Comprimidos bissulcados, sabor carne.



COSACTHEN

Para uso em Cães

Medicamento indicado na avaliação da função adrenocortical em cães, como parte do diagnóstico da insuficiência adrenocortical (Doença de Addison) ou Hiperadrenocorticism (Doença de Cushing).

Apresentação: Frasco de vidro contendo 1 mL.



FELIMAZOLE

Para uso em Gatos.

Tratamento para hipertireoidismo em gatos.

Apresentação: Frasco contendo 100 comprimidos cada de 2,5mg ou 5mg.



FLORA FIX

Para uso em Caninos e Felinos.

Aditivo Probiótico + prebiótico que contribui para o equilíbrio da microbiota intestinal.

Dose/Via de Administração: Administrar 3 a 5 gramas / dia.

Apresentação: Seringa com 15 g.



INVICTO

Para uso em Cães e Gatos.

Invicto (nitempiram) é indicado para o controle de infestações de pulgas em cães e gatos.

Posologia:

Invicto 11,4 mg : 01 comprimido para gatos e cães de pequeno porte com até 11,4 kg.

Invicto 57 mg: 01 comprimido para cães de médio e grande porte com até 57 kg.

Apresentação: Cartuchos contendo 1 blíster com 1 ou 6 comprimidos cada e embalagem hospitalar contendo 20 blísters de 1 comprimido cada.



OSURNIA

Para uso em Cães.

Osumnia® é indicado para o tratamento da otite externa aguda em cães e a exacerbação aguda da otite externa recorrente, causadas pelas bactérias *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Streptococcus canis*, *Proteus mirabilis*, *Staphylococcus intermedius* e pelos fungos *Candida albicans* e *Malassezia pachydermatis*.

Dose/Via de Administração: Administrar 1 tubo de Osumnia, via auricular, em cada ouvido infectado e repetir a administração depois de 7 dias. Após a aplicação, a base do ouvido deve ser levemente massageada, de forma a facilitar a distribuição uniforme do medicamento no conduto auditivo.

Apresentação: Cartuchos contendo 2 ou 20 tubos com ponta macia e flexível.



VETORYL

Para uso em Cães

Tratamento de hiperadrenocorticismismo hipófise-dependente e adrenal-dependente em cães.

Dose/Via de Administração: Por via oral, 1 vez ao dia, junto às refeições.

Dose Inicial: 6mg/Kg, 1 x ao dia - A dose deve ser ajustada de acordo com a resposta individual, determinada por meio de monitoramento.

"Venda sob prescrição e aplicação sob a orientação do Médico Veterinário".

Apresentação: Cartucho contendo 3 blisters com 10 cápsulas cada.



VETRADENT PASTA

Para uso em Caninos e felinos.

Pasta de dente contendo a tecnologia Biotrate, promove uma boa higiene oral através da sua utilização durante a escovação, ajudando a controlar o tártaro.

Utilizar uma pequena quantidade da pasta e escovar levemente os dentes do seu animal de estimação. Use diariamente para obter melhores resultados.

- Limpeza completa para manter os dentes e gengivas saudáveis;
- Sabor Frango.

Apresentação: Tubo com 65g.



VETRADENT SPRAY

Para uso em Caninos.

Spray dental que auxilia no controle do tártaro, além de proporcionar hálito fresco.

Levantar suavemente o lábio superior e borrifar diretamente nos dentes e gengivas duas vezes ao dia.

Para cães até 9kg: Borrife 1 x de cada lado

Para cães com mais de 9 Kg: Borrife 2 x de cada lado

- Fácil de usar
- Prático e não precisa enxaguar

Apresentação: Frasco com 60 mL



ZYCORTAL

Para uso em Cães

Tratamento para substituição da deficiência de mineralocorticoide em cães com hipoadrenocorticismo primário (Doença de Addison).

Dose/Via de Administração: Dose Inicial: 2,2mg/Kg de peso corporal, administrada por injeção subcutânea.

"Venda sob prescrição e aplicação sob a orientação do Médico Veterinário".

Apresentação: Cartucho com um frasco contendo 4 mL (25mg/ml)



SENSPERT CINOMOSE

Para uso em Caninos.

Kit de diagnóstico rápido para detecção qualitativa do vírus da Cinomose em amostra de supuração nasal ou ocular de cães.

Sensibilidade: 98,6% a 100% e Especificidade: 100%

Apresentação: Caixa contendo 1 conta-gotas, 1 frasco com 1 mL de diluente, 1 swab, e 1 placa-teste, lacrada juntamente com um pacote de sílica-gel.



SENSPERT ERLIQUIOSE

Para uso em Caninos.

Kit de diagnóstico rápido para detecção qualitativa de anticorpos contra *Ehrlichia canis* em sangue total, soro ou plasma de caninos.

Sensibilidade: 98,7% e Especificidade: 99,9%

Apresentação: Caixa contendo 01 dispositivo para teste, 01 frasco com solução tampão para diluição da amostra, 01 conta-gotas descartável e sílica gel.



SENSPERT FELV/FIV

Para uso em Felinos.

Deteção qualitativa de anticorpos anti-FIV (Vírus da Imunodeficiência Felina) e antígenos de FeLV (Vírus da Leucemia Felina) em sangue total, soro ou plasma de gatos.

Sensibilidade: 100% e Especificidade: 99,9%

Apresentação: Caixa contendo 01 dispositivo para teste, 01 frasco com solução tampão para diluição da amostra, 01 conta-gotas descartável para a amostra e sílica gel.



SENSPERT GIARDIA

Para uso em Caninos e Felinos.

Kit de diagnóstico rápido para detecção qualitativa de antígeno de *Giardia lamblia* em amostra de fezes de caninos e felinos. Detecta cistos e trofozoítos.

Sensibilidade: 95,8% e Especificidade: 100%

Apresentação: Caixa contendo 01 dispositivo para teste, 01 frasco com solução tampão para diluição da amostra, 01 conta-gotas descartável para a amostra, sílica gel e 01 swab para coleta.



SENSPERT LEISHMANIOSE

Para uso em Caninos.

Kit de diagnóstico rápido para detecção de anticorpos de *Leishmania spp.* em amostra de sangue total, soro ou plasma de cães.

Sensibilidade: 99,2% e Especificidade: 100%

Apresentação: Caixa contendo 1 dispositivo para teste, 1 frasco solução tampão para diluição da amostra, 1 conta-gotas descartável para a amostra e sílica gel.



SENSPERT PARVOVIROSE

Para uso em Caninos.

Kit para detecção do Parvovirus canino em amostra de fezes. Variantes detectáveis: CPV2a, CPV2b e CPV2c.

Sensibilidade: 99% e Especificidade: 100%

Apresentação: Caixa contendo 1 conta-gotas, 1 frasco com 1 mL de diluente, 1 swab, e 1 placa-teste, lacrada juntamente com um pacote de sílica-gel.



CANNIS GLOBULIN POLIVALENTE

Para uso em Caninos.

Indicado para a prevenção e tratamento da Cinomose, Parainfluenza, Hepatite Infecciosa, Adenovirose, Coronavirose e Parvovirose caninas.

Dose/Via de Administração: Administrar 0,5 a 1 ml/Kg (Profilaxia) ou 1 a 2 ml/Kg (Tratamento) por via SC ou IM.

Apresentação: Frasco contendo 5 mL.



GASTROGLOBULIN

Para uso em Caninos.

Indicado para a prevenção e tratamento da Parvovirose e Coronavirose caninas.

Dose/Via de Administração: Administrar 0,5 a 1 ml/Kg (Profilaxia) ou 1 a 2 ml/Kg (Tratamento) por via SC ou IM.

Apresentação: Frasco-ampola contendo 10 mL.



SOROGLOBULIN MAX

Para uso em Caninos.

Indicado para a prevenção e tratamento da Cinomose, Coronavirose e Parvovirose caninas.

Dose/Via de Administração: Administrar 0,25 a 0,5 ml/Kg (Profilaxia) ou 0,5 a 1 ml/Kg (Tratamento) por via SC ou IM.

Apresentação: Frasco-ampola contendo 10 mL.



BIORAIVA PET

Para uso em Caninos e Felinos

Vacina indicada para a prevenção da Raiva em cães e gatos.

Apresentação: Caixa contendo 12 doses.



DEFENSE BRONCH

Para uso em Caninos.

Vacina para prevenção da traqueobronquite infecciosa canina ou "tosse dos canis".

Apresentação: Flow pack com 10 doses.



RONVAC

Para uso em Felinos.

Vacina contra a Panleucopenia, Calicivirose e Rinotraqueíte Felina.

Apresentação: Flow pack contendo 10 doses.



VENCOTHRREE PUPPY

Para uso em Caninos.

Vacina contra a Cinomose, Parvovirose e Coronavirose canina.

Apresentação: Flow pack com 10 doses.



VENCOMAX 8

Para uso em Caninos.

Vacina contra a Cinomose, Parvovirose, Coronavirose, Parainfluenza, Hepatite, Adenovirose, e Leptospirose canina.

Apresentação: Flow pack com 25 doses.



VENCOMAX 11

Para uso em Caninos.

Vacina contra a Cinomose, Parvovirose, Coronavirose, Parainfluenza, Hepatite, Adenovirose e Leptospirose canina.

Apresentação: Flow pack com 25 doses.



VENCOMAX 12

Para uso em Caninos.

Vacina contra a Cinomose, Parvovirose, Coronavirose, Parainfluenza, Hepatite, Adenovirose e Leptospirose canina.

Apresentação: Flow pack com 25 doses.



VENCOSAT

Para uso em Caninos, bovinos, equinos, caprinos, ovinos e suínos.

Soro antitetânico para profilaxia e tratamento do tétano causado pelo *Clostridium tetani*.

Apresentação: Cartucho contendo 1 frasco-ampola de liofilizado e 1 frasco-ampola com 5 mL de diluente estéril acompanhados de seringa e agulha.

